

Inskrivning allogen HSCT checklista läk, HEM 13506

Patient-ID

- ☐ Har donatorn blivit godkänd? Konditionering får inte starta förrän godkännande finns.
- ☐ Är patientens pretransplantationsutredning bedömd och accepterad av BMT- läkare?
- ☐ Finns fungerande central infart?
- ☐ Är patientens status sådant att konditionering kan startas?
- ☐ OBS. Vid blodgruppsförenlighet vid märmg som stamcellskälla: Volym blodtillblandad märmg kan uppgå till 1,5 liter. Bedöm vilken max volym "benmärg" som patienten tål och om farhågor uppkommer att märmgvolym kan bli för stor – informera KITM-läkare om max märmgvolym som accepteras (gäller framför allt barn). Ge inte rutinmässigt blodtransfusion vid lätt sänkt Hb dagarna före planerad märmginfusion.
- ☐ Behörig läkare ska kontrasignera cytostatika ordination som BMT läkare skrivit. Gäller både konditioneringskur och GvHD profylax med Mtx alt postCY
- ☐ Läs "Att uppmärksamma" för ordinerad cytostatikaregim och följ instruktioner ex ang. vätskebalans.
- ☐ Läkemedelslista i Cosmic, följande ordinationer görs:
 - Antiemetika fr kurstart– se kurens "Att Uppmärksamma" och [Illamående och kräkning, profylax och behandling, HEM 13476](#)
 - "Cytostatika enligt Cytodos"
 - VOD profylax K Ursofalk 10 mg/kg (uppdelat på två doser) – from kurstart tom dag + 100
 - Infektionsprofylax: grundregel från d 0 T Ciprofloxacin 500 mg x 2, T Aciclovir 400 mg x 2, T Fluconazol 100 mg x 1 ([Svampinfektioner hos vuxen patient med hematologisk sjukdom, HEM 13562](#) och [Infektionsprofylax vuxna, HEM 13477](#))
 - T Previmys 240 mg dag + 7 till dag + 100 till patienter med pos IgG CMV serologi
 - GvHD profylax (Se [GvHD profylax vuxna och barn, HEM 13537](#))
 - Blodprodukter: erytrocyter leukocytreducerade och strålbehandlade 255 ml vb, och trombocyter 200 ml vb.
Ange transfusionsgränser (i rutan "notera vid administration"). Vanliga gränsvärden är blodtransfusion vid Hb <80, trombocytttransfusion vid TPK <10 (vid feber >15) Se [Blodprodukter... läk HEM 13445](#).
Behövs speciella blodprodukter ex HLA-matchade eller plasmareducerade trombocyter, förbehandling före transfusion mm. (kommentera i ruta "notera vid administration")
 - Inj av "Allogena perifera..." eller Allogen benmärg". Volym skrivs av ssk.
- ☐ EBMT rapport dag 0 skall i nära anslutning till inskrivning fyllas i av patientansvarig läkare

Formulär till: [Allogen HSCT handläggning av patient, barn och vuxen, process, HEM 12844](#)

Ej journalhandling.