

Cosmic – Stroke prevention CDS användarstöd, riktlinje

Bakgrund

CDS Stroke prevention är tillgängligt för läkare på vårdcentraler. Användarstödet utgör en komplettering till informationen i e-kursen CDS -Stroke Prevention och nås via kurskatalogen [Cambio e-learning, \(cambio.se\)](https://cambio.se).

CDS (Clinical Decision Support) är funktioner i Cosmic som ska stödja kliniskt beslutsfattande och därigenom öka patientsäkerhet, vårdkvalité och effektivitet. Cosmics beslutsstöd CDS Stroke prevention infördes på alla vårdcentraler under hösten 2018. Syftet med beslutsstödet är att uppmärksamma läkaren på att en patient med diagnosen förmaksflimmer eller förmaksfladder saknar antikoagulantabehandling och att beslut behöver tas om detta ska sättas in eller inte.

Beskrivning

Vilka patienter hämtas

När diagnosen förmaksflimmer eller förmaksfladder finns registrerad i journalen och antikoagulantia-behandling saknas i läkemedelslistan aktiveras CDS-funktionen och räknar ut CHA2DS2-VASc-poäng. Vid tillräckligt hög riskpoäng tänds CDS-ikonen som en varning. Genom att klicka på ikonen kan ytterligare information hittas.

Dessa varningar finns:

- Patienten har inte medicinsk behandling som följer Socialstyrelsens riktlinjer vid förmaksflimmer.
- Patienten har beslut om att inte ta behandling men har förändrad CHA2DS2-VASc-poäng.
- Patienten har beslut om att inte ta behandling men tidsstämpeln är äldre än ett år.
- Patienten har fått sitt beslut uppskjutet men har förhöjd CHA2DS2-VASc-poäng.

Om patienten har dosdispenserade läkemedel och behandling med antikoagulantia ska antikoagulantia införas på läkemedelslistan i Cosmic. Det innebär att varningen inte tänds så länge antikoagulantia-behandlingen pågår. Pågående antikoagulantia-behandling ska för övrigt alltid finnas insatt på läkemedelslistan i Cosmic på grund av den allvarliga risk för komplikationer och interaktioner som behandlingen innebär.

Att hantera en varning

Välj om varningen skall hanteras på en gång eller senare. Om du väljer att via popup bli påmind senare visas popup-dialogen nästa gång patienten laddas i vårdmottagarlisten.

Om beslut inte kan fattas i samband med aktuell kontakt, ska beslutet uppskjutas kortast möjliga tid, helst bara en dag. Då visas popup-dialogen när patienten hämtas nästa gång av en läkare på vårdcentral.

Beslut

Om beslutet skjuts upp ska det motiveras. De fasta val som finns är följande:

- Patientrelaterat (exempelvis kontraindikationer).
- Labbresultat behövs.
- Remiss till annan vårdenheter.
- Annat skäl (kräver kommentar till exempel Ej PAL).

Beslut ska signeras, att enbart spara går inte. Vid signering skapas automatiskt en journalanteckning som sammanfattar:

- Diagnosöversikten med vilka diagnoser som ansetts adekvata för beslutet.
- CHA2DS2-VASc-poängen utifrån diagnosöversikten.
- Taget beslut och datum för detta.

Om behandling inleds ska recept förskrivas i läkemedelsmodulen alternativt läggas in i läkemedelslistan vid dosdispenserade läkemedel, annars kommer varningen upp igen vid nästa kontakt.

Om beslutsstödet stängs utan signering ligger symbolen med CDS kvar i patientlisten och varningen visas när journalen hämtas nästa gång.

Ångra taget beslut att avstå från behandling

Om patienten ångrar sig direkt efter att ha nekat till behandling kan beslutet inte backas. För att ändra beslut och inleda behandling kan man antingen makulera anteckningen och hämta varningen igen, eller helt enkelt sätta in läkemedel och kommentera insättningen i en vanlig journalanteckning.

Dokumenthistorik

Författare:

Barbro Nordström.

Datum:

2023-01-31 Reviderad av Jenny Eklund, tillägg under Dessa varningar finns.

2024-10-29 Tillgänglighetsanpassat och reviderat, Jenny Eklund