

CVK, CDK eller Subkutan venport – inläggning - regionalt tillägg Barn

Innehåll

Anmälan.....	3
CVK och Subkutan venport	3
CDK (ej för dialys)	3
Preoperativa förberedelser	3
Dokumentation	3
Patientinformation	3
Smärtlindring.....	3
Blodprover	3
Fasta.....	3
Infart	3
Hudtvätt/renbäddning.....	4
Antibiotikaprofylax	4
Subkutan venport/CVK/CDK	4
Röntgen remiss.....	4
Barnkirurg/Interventionist.....	4
Narkosläkare	4
Premedicinering	4
Postoperativ vård	4
PEWS.....	4
Förband/sår.....	4
Infektionstecken.....	5
Röntgenkontroll	5
Smärtskattning/smärtlindring.....	5
Suturer	5
Patientinformation	5
Relaterade dokument i DocPlus.....	5

Relaterade dokument i Vårdhandboken	5
Akademiska Barnsjukhuset/ barnwebben.....	6
Bilaga 1 CVK/ CDK/ Subcutan venport – inläggning barn	7

Detta regionala tillägg är ett komplement till Vårdhandboken "[Central venkateter- Inläggning av CVK](#)" och "[Subkutan venport- inläggning](#)".

Anmälan

CVK och Subkutan venport

Konsultremiss i Cosmic skickas till Barnkirurgi. Viktigt att i samband med detta kontrollera och ange vilka centrala infarter som patienten haft tidigare.

CDK (ej för dialys)

Röntgenremiss i Cosmic- Val av utbud: CDK - Skriv i fältet för kommentarer: till perifer intervention, genomförs i narkos.

Preoperativa förberedelser

Dokumentation

Standardiserad vårdplan: CVK/ CDK/ Subkutan venport– inläggning barn

Patientinformation

Förbered barnet utifrån ålder och mognad se dokument i kvalitetshandboken "Förberedelser och information till barn och föräldrar inför olika vårdprocedurer":

- Använd avdelningens förberedelsematerial
- Informera enligt Vårdhandboken, "Central venkateter- Inläggning av CVK" och "Subkutan venport- inläggning"
- Informera om "Akademiska Barnsjukhusets Barnwebb"
- Informera om postoperativ smärta och smärtskattning enligt barnsjukhusets riktlinjer "Smärtskattning – akuta smärttillstånd hos barn". Dokumentera vilken smärtskattningsskala som patienten fått undervisning om

Smärtlindring

Följ barnsjukhusets riktlinjer, "Smärtbehandling vid akutsmärta hos barn äldre än 3 månader", "Smärtbehandling vid akut smärta hos barn yngre än 3 månader".

Blodprover

Blodgruppering, BAS-test, Blodstatus, P-PK, P-APT-tid, P-Natrium, P-Kalium. Blodproverna får vara max 7 dagar gamla. **OBS!** Ej nytt P-APT vid tidigare normalt värde och att ingen misstanke om koagulationsstörning finns.

Fasta

Enligt riktlinjen: "Fasta, klar dryck och EMLA, för barn som ska opereras på barnoperationsavdelning"

Infart

Patienten bör ha en fungerande infart. Undantag kan göras efter överenskommelse med narkospersonal.

Hudtvätt/renbäddning

Enligt Vårdhygien "Preoperativa hudförberedelser":

- Naglar kortklippta, rena och utan nagellack
- Inga smycken.
- Renbäddad säng efter dusch nummer ett.
- Ren operationsskjorta efter dusch nummer två.

Antibiotikaprofylax

Patientansvarig läkare ordinerar antibiotikaprofylax enligt barnkirurgens riktlinje "Central venkateter (CVK)/ Subkutan venport (Celsite)". Antibiotika skickas med patienten till operation.

Subkutan venport/CVK/CDK

Subkutan venport och CVK tillhandahålls av barnoperation. CDK tillhandahålls av Interventionslab.

Röntgen remiss

Patientansvarig läkare skriver röntgenremiss för postoperativ kontroll av kateterspetsläge och eventuell förekomst av pneumothorax. Remissen skall vara akut och vara märkt för preliminärt svar.

Barnkirurg/Interventionist

Operatören skall alltid träffa patienten före ingreppet. I samband med detta kontrolleras att antibiotikaprofylax ordinerats, samt att barnkirurg/interventionist sidomarkerar och skriver sin signatur på anestesijournalen.

Narkosläkare

Alla patienter som inte sövts tidigare via Barnanestesi skall träffa narkosläkare för narkosbedömning, samt vid behov då patient eller föräldrar så önskar. Barnanestesi har öppen narkosbedömning måndag – torsdag från klockan 14.00.

Premedicinering

Narkosläkare alternativt patientansvarig läkare ordinerar vid behov lämpligt läkemedel för premedicinering. Alla patienter skall premedicineras med Paracetamol, enligt generell ordination. Narkosläkare ordinerar läkemedel på Preanestesiblancketten.

Postoperativ vård

PEWS

PEWS mätning utförs vid ankomst till vårdavdelningen.

Förband/sår

Förbandet skall inspekteras första gången vid ankomst till avdelningen och dokumenteras i den standardiserade vårdplanen. Förbandet inspekteras sedan dagligen till behov ej föreligger.

Infektionstecken

Vid tecken på infektion som rodnad, värme, vätska, svullnad och ömhet skall extra sårkontroll göras. Vid sårkontroll är det viktigt att alltid dokumentera hur såret ser ut.

Röntgenkontroll

CVK och Subkutan venport får användas efter att patientansvarig läkare har godkänt röntgensvaret, undantag är vätskeinfusion. Om möjligt ska infarten röntgenkontrolleras på väg från BUVA till avdelningen. CDK 'n kontrollröntgas på operation om inget annat anges.

Smärtskattning/smärtlindring

Smärtskatta enligt barnsjukhusets riktlinjer "Smärtlindring för barn – kvalitetsmål".

Smärtlindra enligt barnsjukhusets riktlinjer "Smärtbehandling vid akutsmärta hos barn äldre än 3 månader", "Smärtbehandling vid akut smärta hos barn yngre än 3 månader".

Suturer

De suturer som används är av resorberbart material. Det kan ta upp till 8 veckor för suturtråden att lösas upp. I undantagsfall om det efter två veckor finns suturer kvar som irriterar huden kan man klippa bort suturen. I undantagsfall används icke resorberbar sutur, dessa skall tas bort efter 14 dagar.

Patientinformation

Muntlig information ges till patient/föräldrar/närstående om skötsel av Subkutan venport eller CVK/CDK.

Efterlek med undervisningsdocka rekommenderas.

Relaterade dokument i DocPlus

- [Förberedelser och information till barn och föräldrar inför olika vårdprocedurer](#)
- [CVK/subkutan venport](#)
- [Smärtskattning – akuta smärttillstånd hos barn](#)
- [Smärtlindring för barn – kvalitetsmål](#)
- [Smärtbehandling vid akutsmärta hos barn äldre än 3 månader,](#)
- [Smärtbehandling vid akut smärta hos barn yngre än 3 månader](#)
- [Fasta, klar dryck och EMLA, för barn som ska opereras på barnoperationsavdelning](#)
- [Preoperativa hudförberedelser](#)

Relaterade dokument i Vårdhandboken

- [Inläggning av CVK](#)
- [Inläggning subkutan venport](#)
- [Subkutan venport](#)

Bilaga 1 CVK/ CDK/ Subcutan venport – inläggning barn

Vårdbehov Sökord Omvårdnadsdiagnos/-er	Kval. ind.	Mål	Åtgärder/Behandling Sökord	Resultat Fritext eller fasta val	Utvärdering Fritext eller fasta val	Fasta val Enval eller Flerval	Numeriskt Enhet Min-värde Max-värde Ref-värde
Standardiserad vårdplan							
Åtgärder före operation							
CVK/ CDK/ Subcutan venport- inläggning barn		Trygg och väl förberedd patient och närstående Inga komplikationer Vård enligt Vårdrutin CVK/ CDK/ Subcutan venport – inläggning barn			Utvärdering	Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av	
			Information				
			Åldersanpassad information om operationen samt förberedelser			Utfört Fått muntlig information Fått skriftlig information Oförmögen att tillgodogöra sig information	
			Information/Undervisning				
			Muntlig information enligt länkade Vårdrutin smärta barn		Barn lista	Flerval: Information given om: FLACC Ansiktskala VAS	
			Samordning				
			Remiss för CVK-inläggning			Utfört Ej aktuellt	
			Speciell omvårdnad				

Vårdbehov Sökord Omvårdnadsdiagnos/-er	Kval. ind.	Mål	Åtgärder/Behandling Sökord	Resultat Fritext eller fasta val	Utvärdering Fritext eller fasta val	Fasta val Enval eller Flerval	Numeriskt Enhet Min-värde Max-värde Ref-värde
			Preoperativa prover och blodgruppering		LUL lista	Blodgruppering finns Blodgruppering utförd Blodgruppering ej aktuellt Giltigt BAS-test finns BAS-test utförd BAS/ MG-test ej aktuell MG-test utfört Giltigt MG-test finns Blod beställt Blod finns Giltiga provsvar finns Prover tagna	
			Skötsel				
			Fasta enligt rutin			Informerat patient/närstående Faster från kl: Flytande frukost till kl:	
			Speciell omvårdnad				
			PVK			Utfört	

Vårdbehov Sökord Omvårdnadsdiagnos/-er	Kval. ind.	Mål	Åtgärder/Behandling Sökord	Resultat Fritext eller fasta val	Utvärdering Fritext eller fasta val	Fasta val Enval eller Flerval	Numeriskt Enhet Min-värde Max-värde Ref-värde
			Skötsel				
			Dusch med Klorhexidintvål x 2 enligt Vårdrutin ”Preoperativa hudförberedelser”		Kirurg lista	Informerad Dusch 1 utförd. Dusch 2 utförd.	
			Läkemedelshantering				
			Initiera ordination på antibiotikaprofylax. Skicka med till operation			Utfört Ej aktuellt	
			Läkemedelshantering				
			Premedicinering enligt ordination			Utfört Ej aktuellt	
Åtgärder efter operation							
		Inga komplikationer			Utvärdering	Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av	
			Observation/övervakning				
			PEWS vid ankomst till avdelning och därefter enligt ordination			Påbörjat Avslutat	
			Speciell omvårdnad				
			Förbandskontroll			Utfört	
			Samordning				
			Röntgad och godkänd för användning			Utfört	
			Observation/övervakning				
			Smärtskattning enligt länkad Vårdrutin			Påbörjat Avslutat	
			Observation/övervakning				

Vårdbehov Sökord Omvårdnadsdiagnos/-er	Kval. ind.	Mål	Åtgärder/Behandling Sökord	Resultat Fritext eller fasta val	Utvärdering Fritext eller fasta val	Fasta val Enval eller Flerval	Numeriskt Enhet Min-värde Max-värde Ref-värde
			Miktionskontroll efter narkos			Utfört	
			Medverkan				
			Efterlek med docka			Utfört Ej aktuellt	