

Cordarone - tablettbehandling

Cordarone®, amiodaron

Indikationer

Recidivprofylax vid förmaksflimmer/förmaksfladder.
Behandling vid ventrikulära arytmier.

Kontraindikationer

Hypotoni, bradykardi, sinoatrial sjukdom, AV-block II-III, bifascikulärt block, tyroideasjukdom, nedsatt leverfunktion och nedsatt lungfunktion (hjärtinsufficiens, hypokalemi).

Biverkningar

Trötthet, yrsel, huvudvärk, sömnlöshet, tremor, illamående, förstoppning, smakrubbningar, fotosensivitet med hudpigmentering (blåaktig missfärgning på exponerade hudområden), ögontorrhet, muskelsvaghet proximalt, hypo- och hypertyreos, lever- och lungpåverkan och proarytmi.

- Kan insättas polikliniskt
- Patientinformation finns
- Bör tas i samband med måltid för att undvika gastrointestinala biverkningar
- Finns även som infusion, se [Amiodaron \(Cordarone\) infusion vid arytmier](#)

Dosering

Första veckan: T Cordarone 200 mg x 3
Andra veckan: T Cordarone 200 mg x 2
Därefter: T Cordarone 200 mg x 1

Vanlig underhållsbehandling är alltså T Cordarone 200 mg x 1.

Kontroll

Före behandling:	TSH, leverstatus, elstatus
Tre månader efter insättning:	TSH, leverstatus, elstatus, EKG
Ett år efter insättning:	TSH, leverstatus, elstatus, EKG
Därefter en gång/år:	TSH, leverstatus, elstatus, EKG
Var sjätte – nionde månad:	Läkarkontroll
Efter behandlingen:	TSH till och med sex månader efter behandlingens avslutande

Vid nyinsättning av Cordarone skrivs pappersremiss till hjärtmottagningens sjuksköterskor. Uppföljande kontroller av C-länspatienter sker sedan på hjärtmottagningen.

Cordarone påverkar effekten av många andra läkemedel. Den vanligaste situationen är vid samtidig behandling med Waran, då Warandosen oftast behöver minskas. Tättare PK-kontroller i detta skede.

Läkemedlet medför känslighet för solbestrålning. Patienten ska undvika solbad och/eller använda hudlotion med kraftig solskyddsfaktor.

Vid nytillkomna symptom från luftvägarna (exempelvis andfåddhet) ska patienten ta kontakt med hjärtmottagningen för kontroll och eventuell lungröntgen.