

Sandimmun via sond gastrostomi

Innehåll

Material	1
Källa.....	2
Dokumenthistorik	2

Material

- Oral lösning Sandimmun Neoral 100 mg/ml
- Specialspruta som medföljer Sandimmun flaskan (**OBS! FLERGÅNGSSPRUTA**)
- Spruta för oralt / enteralt bruk
- Dricksglas gjort av glas (Ej plastmaterial)
- Matningsslang till gastrostomi (Om patienten har gastrostomi)

1. Viktigt att mixturen i möjligaste mån inte kommer i kontakt med plast.
2. I beredningsrum / läkemedelsrum dras mixturen upp med hjälp av medföljande specialspruta.
3. Mixturen sprutas därefter ner i ett vanligt glas (ej av plastmaterial). Torka av sprutan på utsidan med rent papper. Sprutan får inte komma i kontakt med vatten eller annan vätska.
4. Den orala lösningen ska omedelbart före intag blandas i ett glas (ej plastmaterial) med vatten, kall chokladdryck, mjölk eller fruktjuice (inte grape, ananas, papaya). Blandningen omrörs väl och intas genast (ska ske inne hos patienten). Minsta mängd vätska 1 mL.
5. Vid administrering i sond, gastrostomi kan sondsprutor (Spruta för oralt /enteralt bruk) användas efter att mixturen gjorts i ordning enligt punkt 2 – 4. Uppdragning (i sondsprutan) av den blandade lösningen måste ske inne hos patienten, och tillföras patienten omedelbart.
6. Risken är större att läkemedlet fastnar i slangen om man ger det outspätt direkt i sonden eller gastrostomin.
7. Använd om möjligt KORT matningsslang till gastrostomin. (Minsta möjliga kontakt med plast). Finns inte kort läkemedelsslang, går det att använda den långa.

Källa

FASS + Novartis läkemedelsföretag.

Dokumenthistorik

Författare

Ann-Kristina Lax, sjuksköterska, Blod- och tumörsjukdomar, VO Barnsjukhuset
Anna Hallman, sjuksköterska, Blod- och tumörsjukdomar, VO Barnsjukhuset

Revisionsdatum

2021-02-22 Anna Hallman: Reviderat dokumentet.