

Omläggning av operationssår, ortopedi

Inspektion av operationsförbandet görs av ansvarig sjuksköterska var gång hon/han påbörjar sitt arbetspass och därefter vid behov. Fotodokumentera sår som är avvikande. Torra, oretade och icke läckande bandage ska lämnas orörda. Omläggning av operationssåret sker enligt följande:

- **Läckage av operationsförband första operationsdygnet.**
Förstärkning av operationsförbandet med ABS-förband. Förband som förstärkts under första operationsdygnet ska läggas om sterilt nästkommande dag.
- **Mättat eller stelt förband.**
Omläggning enligt steril rutin.
- **Läckande förband.**
Omläggning av operationssåret görs enligt steril rutin.
 - **Avdelning:** Omläggning av läckande förband sker med steril rutin. Om läckaget är oväntat stort/frekvent, eller såret är avvikande, ska läkare bedöma såret i samband med rond eller vid behov, akut.
 - **Mottagning:** Omläggning sker tillsammans med läkare.
- **Misstänkt infektion.**
Omläggning sker i samband med att läkare tittar på såret. Steril rutin används och sårodling tas i samband med detta efter läkarordination.

Omläggningsmetoder

Omläggning enligt ren rutin.

Information finns i vårdhandboken.

Omläggning enligt steril rutin.

I samband med steril omläggning bör två personal medverka, en person (personal 1) som gör själva omläggningen och den andra (personal 2) som assisterar. I samband med operation ska basala hygienregler och klädregler följas. Under omläggningen används sterila instrument, sterila handskar, sterilt förband och sterila lösningar.

Utanför patientsalen:

Desinficera omläggingsvagnen, vid behov rengör den innan.

Plocka fram och lägg upp materialet som skall användas på vagnen. OBS: Öppna inte förpackningarna ännu. Tvätta och desinficera händer och underarmar. Ta på plastförkläde.

Därefter tas omläggingsvagnen in på salen och patienten informeras om vad som ska ske.

Personal 1 tar på plastrandskar och tar bort det gamla förbandet. Kasserar detta samt de använda handskarna. Därefter desinficeras händer och underarmar igen.

Under tiden sterildukar personal 2 upp för omläggningen på omläggingsvagnen. Personal 1 tar på sterila

handskar och rengör såret med sterilt koksalt och sterila kompresser. Byt handskar om de blivit kontaminerade. Torkar försiktigt den omgivande huden torr med sterila kompresser och applicerar det nya sterila förbandet.