

PICC - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna, regionalt tillägg

Innehåll

Syfte och omfattning	2
Remisshantering	2
Förberedelser före inläggning	2
Patientinformation	2
Förberedelse	2
Utsättning eller dosjustering av antikoagulantia	2
Inför elektiv PICC inläggning:	2
Inför akut PICC inläggning:	2
Nutrition	3
Premedicinering	3
Eftervård efter inläggning av PICC	3
Observation/ övervakning	3
Åtgärder dagen efter	3
Övrigt	3
Utskrivning	3
Referenser	3
Dokumenthistorik	3
Relaterade länkar	4
Bilaga 1 SVP RU PICC förberedelse och eftervård vid inläggning, vuxen	5

Syfte och omfattning

Detta dokument är ett regionalt tillägg till Vårdhandboken.

Var god se [förberedelser och inläggning](#) Perifert insatt central kateter (PICC)

Dokumentet gäller för inläggning vid Accessmottagningen och onkologens PICC mottagning vid Akademiska Sjukhuset.

Remisshantering

- Remiss i Cosmic för inläggning vid Accessmottagningen.
- Remisshantering till OBA, bokning sker via nybesökremiss

Förberedelser före inläggning

Patientinformation

Muntlig samt skriftlig Information dag före inläggning. Se [Patient- och anhöriginformation om PICC-line – behandling](#).

Förberedelse

- Två preoperativa s.k. dubbelduschar rekommenderas, som innebär två intvålningar under samma duschtillfälle med klorhexidintvål (Hibiscrub eller Descutan). Dessa utförs före operationen med minst 6 timmar mellan duschtillfällena. Den sista dubbelduschen ska tidsmässigt ske så nära operationen som möjligt, [Preoperativa hudförberedelser](#)
- Operationsdagen ska patienten bära operationsskjorta och operationsstrumpor. Patient får inte ha nagellack, lotion, parfym, smink eller smycken. Sängen ska vara renbäddad, märkt med namn och avdelningstillhörighet samt vara försedd med infusionsställning.

Utsättning eller dosjustering av antikoagulantia

Inför elektiv PICC inläggning:

ASA (Acetylsalicylsyra) eller andra trombocythämmare (till exempel klopidogrel) ska inte utsättas inför inläggning av PICC om inte patienten står på trippelterapi.

Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK, till exempel Eliquis, Pradaxa eller Xarelto) sätts om möjligt ut senast ett dygn före operationen. Gäller ej öppenvårdspatient

Vid behandling med Waran skall INR/PK vara under 3.

Lågmolekylärt heparin:

- Inget lågmolekylärt Heparin ges på operationsdagens morgon.
- Fulldosbehandling kan återupptas 2 timmar efter utförd operation eller enligt annan ordination.

Inför akut PICC inläggning:

I vissa fall gäller inte ovanstående rekommendationer för akut inläggning av PICC. Patientens behov av infart prioriteras i stället för utsättning eller dosjustering av antikoagulantia.

Nutrition

Patienten äter frukost eller lunch som vanligt inför ingreppet. Då mår hen bättre och behöver mindre smärtlindring och ångestdämpande mediciner.

Premedicinering

Enligt läkarordination. Ordineras dag före inläggning av PICC. De flesta patienter behöver inte premedicineras.

Eftervård efter inläggning av PICC

Observation/ övervakning

Förbandet skall inspekteras vid ankomst till avdelningen. Vid inläggning av PICC görs ett ytligt snitt i huden, där man sedan lägger ett tryckförband om blödning uppstår.

Är förbandet förstärkt med ett yttre tryckförband för att minska blödning avlägsnas detta 4 timmar efter inläggning.

Inom öppenvården, förband avlägsnas vid nästa besök

Åtgärder dagen efter

Dagen efter PICC-inläggning görs ny steril omläggning och det inre tryckförbandet (oftast en blodig kompress) tas bort. Kompressen skall tas bort för att minimera risken för infektion. Omläggning görs enligt [Omläggning - Vårdhandboken \(vardhandboken.se\)](#)...

Övrigt

Om inget annat anges kan PICC användas omedelbart.

Utskrivning

Informera patienten att ta kontakt med primärvården/ distriktssköterska för omläggning och genomspolning var 7:e dag.

Referenser

SFAI;s rekommendationer från 2018-12-03.

Dokumenthistorik

Författare: Jeanette B Pettersson SSK onkologen AS, Anna Holma SSK Accessmottagningen AS, Wojciech Rudolf Weigl ÖL Accessmottagningen AS

Granskare 2019-11-27, Magdalena Adde ÖL onkologen AS, Merete Adegunle SSK hematologen AS, Peter Frykholm ÖL Anopiva AS, Ingalill Johansson SSK onkologen AS, Linda C Johansson GC Medicinavd LE, Birgitta Lytsy ÖL AS, Igor Zadonsky ÖL SC LE

Revideringsdatum: 2022-02-14 Anna Holma ssk accessmottagningen Helena G Larsson ssk Sofia Nöjd ssk Karin Hagland ssk OBA AS, Jenny Gestlöf ssk, Karl Eklund ssk LAH mindre textkorrigeringar

2022-11-18 tillägg av omläggning dagen efter i vårdplanen

Relaterade länkar

Förberedelser och inläggning Perifert insatt central kateter (PICC)

<https://www.vardhandboken.se/Uppsala-lan/katetrar-sonder-och-dran/picc-line/forberedelser-och-inlaggning/>

PICC – Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna, regionalt tillägg

<https://lt uppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/DPDocumentRedirect.aspx?id=DocPlusSTYR-12133>

Bilaga 1 SVP RU PICC förberedelse och eftervård vid inläggning, vuxen

Drift i journal: 2022-11-21

ICNP

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
Åtgärder före operation					
PICC inläggning vuxna		Förberedelser enligt "Förberedelser och inläggning av PICC", Vårdhandboken och "PICC - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna – regionalt tillägg" Inga komplikationer			Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av
			Information		
			Information om PICC, inläggning samt om förberedelser	Fått muntlig information Fått skriftlig information Behov av upprepad information Information given till närstående Information given via tolk Påbörjat Utfört	
			Samordning		
			Remiss till Accessmottagning	Utfört, Accessmottagning	
			Läkemedelshantering		
			Initiera dosöversyn vid behandling med låg molekyllärt heparin.	Utfört Ej aktuellt	
			Läkemedelshantering		

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
			Initiera översyn av perorala antikoagulantia	Utfört Ej aktuellt	
			Skötsel		
			Förbered huden inför operation: Två dubbelduschar med Klorhexidintvål (10015484)	Informerad Dusch 1 utförd. Dusch 2 utförd. Tar själv ansvar	
			Skötsel		
			Smink/nagellack/smycken tas bort. Operationsskjorta och strumpor.	Utfört Ej aktuellt	
			Skötsel		
			Sängen märks och utrustas samt renbäddas	Utfört Ej aktuellt	
			Läkemedelsbehandling		
			Administrera läkemedel: Premedicinering enligt ordination (10025444)	Utfört Ej aktuellt	
Åtgärder efter operation					
		Effektiv postoperativ återhämtning. "Förberedelser och inläggning av PICC", Vårdhandboken och "PICC - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna – regionalt tillägg"			Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
		Inga komplikationer (10028691)			
			Samordning		
			Kontrollera att läkare/operatör godkänt användning	Utfört	
			Observation/övervakning		
			Bedöm smärta: Smärtskattning (10026119)	Påbörjat Avslutat	
			Observation/övervakning		
			Inspektion och bedömning av förband och omliggande hud (10041126)	Påbörjat Avslutat	
			Samordning		
			Dokumentera insättning och indikation i journaltabell RU In- och utfarter	Utfört	
			Specifik omvårdnad		
			Dagen efter: Steril omläggning samt borttagande av det inre tryckförbandet	Utfört	
			Information		
			Information om omläggning hos primärvård/ distriktssköterska	Utfört	