PICC - Avlägsnande - vuxna, regionalt tillägg

Syfte och omfattning

Detta dokument är ett regionalt tillägg till Vårdhandboken.

Var god läs och följ Avlägsnande Perifert insatt central kateter (PICC) med det som står i detta dokument som tillägg.

Avlägsnande av permanent fästanordning

Fixeringsteknik med en ankarliknande fästanordning s.k. SecurAcath: se bilaga 1.

Accessmottagningen rekommenderar:

1. Lägg lokalbedövning 0,5 centimeter nedanför fästet, Xylocain 10 mg/ml 1-2 ml subkutant enligt ordination. Alternativt bedöva med medicinsk plåster 25 mg/25mg som till exempel EMLA eller Tapin över fästet som får verka i ca. 1 timme.
2. Följ alternativ 2 och klipp itu fästets bottenplatta för att avlägsna SecureAcath.

Dokumentation sjuksköterska

Vårdavdelning:

I vårdplanen SVP LUL PICC hantering vårdavdelning, vuxen dokumentera avlägsnande samt ev. odling av kateterspets. Avsluta SVP med utvärdering av mål.

Mottagning:

I vårdplanen SVP LUL PICC hantering mottagning, vuxen dokumentera avlägsnande samt ev. odling av kateterspets. Avsluta SVP med utvärdering av mål.

I Journaltabell In- och utfarter LUL dokumenteras följande:

- Borttagen datum/tid.
- Uttagningsorsak:
    - Behandling avslutad. Kateter fungerat bra under hela behandlingsperioden.
    - Behandling avslutad- mindre komplikationer, vg se journal.
    - Felaktigt läge.
    - Asymtomatisk trombos.
    - Symtomatisk trombos.

- Stopp i kateter.
- Misstänkt infektion.
- Säkerställd infektion.
- Hudskada intill kateter.
- Patientens önskemål (indikation kvarstår).

Avdelningar med metavision

Dokumenterar avlägsnandet, uttagningsorsak samt ev. odling av kateterspets under fliken Accesser.

Referenser

SFAI;s rekommendationer från 2018-12-03.

SecurAcath-Vard-underhall-och-borttagning.pdf Hämtat 2025-05-08 från www.nordicmedcom.se – Produkter – SecurAcath för att fixera PICC och CVK – Secur Acath Vard Underhall och Borttagning

Dokumenthistorik

Författare: Jeanette B Pettersson SSK onkologen AS

Granskare 2019-10-25: Merete Adegunle SSK hematologen AS, Peter Frykholm ÖL Anopiva AS, Anna Holma SSK Accessmottagningen, Ingalill Johansson SSK onkologen, Linda C Johansson GC Medicinavd LE, Birgitta Lytsy ÖL AS, Igor Zadonsky ÖL SC LE

Revideringsdatum: 2022-02-11 Jimmy Almström läkare Anna Holma ssk accessmottagningen Jakob Morén läkare vårdhygien Merete Adegunle ssk hematologen, Karl Sigvard Eklund ssk, Jenny Gestlöf ssk LAH Tillägg av avlägsnande av permanent fästanordning

2025-05 Anna Holma ssk accessmottagningen AS, Jonas Halden läk accessmottagningen AS, Merete Adegunle ssk hematologen, Linda C Johansson GC Medicinavd LE, Mikael Stenhem läk vårdhygien

Uppdaterat bilaga för borttagning av SecurAcath.

Bilaga 1 Borttagande av SecurAcath

Borttagning av enhet

securAcath



STEG ETT

- Lyft SecurAcath från patienten.
- Ta tag i HOLD-fliken med ena handens tumme och pekfingerför att stabilisera vingarna på SecurAcath.



STEG TVÅ

- Bänd uppåt vid kanten av LIFT-fliken med den andra handen för att lossa locket från basen (som att öppna en burk läsk)
- Undvik att vrida basen när du tar bort locket. Vridning flyttar fästfötterna under huden och kan vara obekvämt för patienten.



STEG TRE

- Ta bort katetern - använd inte överdriven kraft.
- Håll trycket på plats för att uppnå hemostas.

ALTERNATIV- VIKA BASEN

Kan användas med eller utan katetern på plats



STEG FYRA

- Applicera ett hårt tryck på införingsstället för att hålla vävnaden stilla.
- Vik vingarna nedåt för att föra ihop fötterna under huden.

HJÄLPSAMMA TIPS

- Använd kompresser indränkta i NaCl om införingsstället är fast eller om det finns en sårskorpa.
- Ett analgetikum kan användas för att bedöva platsen för att eliminera obehag under borttagningen om patienten är mycket smärtkänslig.
- Ett fast tryck på platsen för att hålla vävnaden på plats ger en enklare borttagning.
- Ta avsiktligt bort fötterna- följ fotens form.
- Obehag för patienten kan minimeras eller elimineras genom att fästfötterna tas bort snabbt, utan att vrida eller tveka.



STEG FEM

- Håll den vikta basen horisontellt mot huden.
- Använda snabba, avsiktliga uppåtgående rörelser för att ta bort efter fästfötternas form.

ALTERNATIV- DELA BASEN

Katetern måste tas bort före detta alternativ.



STEG FYRA

- Använd en sax med trubbig spets för att klippa basen helt på mittenpå längden längs det blå spåret, samtidigt som du håller vingarna stadigt.
- Vridning kommer att leda till obehag så ett säkert stadigt snitt är viktigt.



STEG FEM

- Tryck hårt på införingsstället med en hand.
- De flexibla fästfötterna är formade som "L" med fötter som sträcker sig 5 mm till varje sida av införesstället.



STEG SEX

- Vrid den blå kanten uppåt och använd en snabb, avsiktlig uppåtgående rörelse för att ta bort varje fot separat. Följ fotens form samtidigt som du håller greppet på huden nära införingsstället.



VALFRITT

- Om du möter överdrivet motstånd, håll ett hårt tryck över foten med ett finger vid införingsstället.
- Dra foten mot trycket från fingret för att räta ut den flexibla foten när du drar förbi motståndet.
- Fästfoten av Nitinol är designad att flexa ut från platsen utan att orsaka vävnadsskada.