

Dödsfall - omhändertagande av avliden, misstänkt eller konstaterad covid -19 på eller utanför sjukhus

Bakgrund

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom. Den huvudsakliga smittvägen för covid-19 sker via händer, kläder, ytor och föremål (kontaktsmitta). Därutöver kan smittspridning ske via droppar om patienter hostar eller nyser. I undantagsfall och vid vissa vårdmoment smittar covid-19 luftburet. Viruset dödas omedelbart vid kontakt med alkoholbaserade desinfektionsmedel som är upphandlade för händer och ytor. Efter placering i bisättningsäck/body bag/ inplastning, när direkt kontakt med den avlidne inte längre är möjlig, minimeras alla källor till smittrisk. Detta påverkar riskbedömningen i olika faser av omhändertagandet och vad som är adekvat skyddsutrustning.

Hantering av avliden

Personen skall hanteras som smittförande och omhändertagas enligt följande riktlinjer för detta. Adekvat skyddsutrustning skall användas:

- Använd munskydd (klass II eller klass IIR) vid allmän hantering av kroppen. Om risk för aerosolbildning föreligger, tex extubering, används andningsmask FFFP3.
- Visir eller skyddsglasögon
- Skyddshandskar
- Långärmad vätskeavvisande skyddsrock eller långärmad engångsplastförkläde

Ta hjälp av en kollega för att säkerställa att skyddsutrustningen sitter korrekt. Den avlidne läggs i särskild bisättningsäck/ body bag inför vidare transport. I avsaknad av bisättningsäck/body bag kan istället inplastning av den avlidne ske. I avvaktan på skriftlig rutin för inplastning i detta dokument, kan obduktionsavdelningen på Klinisk patologi kontaktas för utbildning i hur sådan inplastning ska ske, på telefon 13859.

Plasten går att beställa per mail enligt nedan:

info@wemaco.se

Artikelnummer 1208-034 PE V-folie 1000/1000x0.15 mm 50 m per rulle, ange leveransadress och faktureringsadress inkl faktureringsreferens i mailet
tel 0221-376600 vid frågor till leverantören

Följ folkhälsomyndighetens uppdaterade version inför varje nytt omhändertagande.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/rekommendationer-for-hantering-av-avliden-med-bekraftad-covid-19/>

Smittrisk, utrustning samt rutiner

All personal som är involverad skall ha tillgång till rätt information. Basala hygienrutiner följs, adekvat skyddsutrustning och lokala städrutiner skall efterföljas. Se [Coronavirus, covid-19, omhändertagande utanför VO Infektionssjukdomar](#)

Transport

Inför transport

Transport Inför transport I förberedelserna inför transport behandlas den avlidne som smittförande

- Id-band på handleden för att säkerställa identifieringen av den avlidne
- Förbered för förflyttning till bårhus genom att lägga lakan/plast/lakan under samt ett lakan ovan den avlidne. Rulla ihop underlaget längs sidorna knyt ihop ändarna med bomullsband.
- Lägg den avlidne i bisättningsäcken/ body bag / inplastning
- Fäst två namnkort utanpå bisättningsäcken/ body bag/ inplastningen. På namnkorten ska SMITTA anges.
- När yttre inplastning ersätter bisättningsäcken/ body bag omsveps denna av ett lakan.

Yttre inplastning efter svepning



Vik plasten över



Vik plasten enligt bilderna och tejpa ihop plasten längs de streckade linjerna. Namnkort (2st märkta SMITTA) ska fästas på plasten och sedan ska inplastningen omsvepas av ett lakan.





Informera berörd personal om att smitta föreligger och att bisättnings säcken/body bag/ inplastningen inte får öppnas.

Transport från sjukvårdshuvudman till begravningshuvudman (kylrum) ska ske av anlitad begravningsbyrå. Den avlidne transporteras i bisättnings säck/ body bag/ inplastningen. Transporten ska ske direkt till anvisat kylrum på klinisk patologi. Remitterande enhet har skyldighet att rapportera om det föreligger konstaterad eller misstänkt Covid-19 smitta på transportintyg samt namnkort.

Avsked av den avlidne

På patologen har vi ej avsked i nuläget.

Explosiva implantat

Om kroppen skall jordfästas behöver implantat ej avlägsnas. Ifall det är frågan om kremering kan man ta ut implantatet efter 5 dagar i kyl. Adekvat utrustning skall då användas. Om defibrillator ska det anges om den är inaktiverad.

Vid klinisk obduktion

Alla obduktionsremisser måste innehålla information i fritext om patient är misstänkt eller konstaterad covid-19-smittad eller friad. Eventuell obduktion av smittad utförs efter samråd med

verksamhetschef och sektionschef. Den avlidne utlämnas sju dagar efter dödsfallet om inget beslut inkommit angående obduktion.

- Covid-19/ smittobduktioner utförs efter beslut och i samråd med medicinsk ansvarig läkare vid Klinisk Patologi.
- Ber samtliga remittenter att begära obduktion endast vid speciella fall.
- Tydliga anamnestiska uppgifter samt kontaktuppgifter till ansvarig läkare ska anges på remissen.
- Alla obduktionsfall hanteras som potentiellt smittsamma.
- Om skyddsutrustning saknas kan obduktion ej utföras.

OBS

Säkerställ att rättsmedicinsk undersökning ej ska utföras.

Dokumenthistorik

Författare Katharina Ericson ÖL Patologen 2020-03-18

Granskare Diari Ghafouri; Fredrik Tamsen; Katharina Ericson; Helena Olofsson

Revidering 2020-03-24 Helena Olofsson, 2020-04-17 Diari Ghafouri 2020-04-23 Diari Ghafouri