

# Covid-19 - Vaccination Anafylaktisk reaktion

Gäller för externa vaccinationslokaler. Läkemedel enligt listan, syrgas och dropputrustning ska finnas på samtliga enheter.

## Symtom

Luftvägar	Svullnad och klåda i halsen, sväljningssvårigheter, andningssvårigheter.
Cirkulation	Kallsvett, blekhet, hjärtklappning, blodtrycksfall.
Allmänna	Inre oro, obehagskänsla, illamående.
Hud	Klåda, rodnader, nässelutslag, svullnader.

## Akuta åtgärder

- Lägg ner personen.
- Ge adrenalin intramuskulärt på lårets utsida (ex. autoinjektor EpiPen 300 µg).
  - Barn och ungdomar >30 kg samt vuxna: 300 µg,
  - Barn 15-30 kg: 150 µg
- Larma 112.
- Kontrollera andning och cirkulation, puls och blodtryck.
- Ev. upprepa adrenalininjektionen efter 5-10 min från första dos.
- Ge syrgas, minst 5 L/min på mask.
- Sätt intravenös infart och starta infusion med Ringer-acetat, snabb tillförsel.
- Ge kortison och antihistamin.
- Starta hjärt-lungräddning vid andnings- och cirkulationsstillestånd.

Låt personen ligga ner även efter initial förbättring – en hastig uppresning kan leda till livshotande blodtrycksfall.

<b>Kortison</b> skyddar mot reaktion några timmar efter det akuta skedet. Kortison ges även vid behandling av lindrig-måttlig allergisk reaktion.			
Tabl Betapred, löslig	0,5 mg	≥6 år	10 tabletter

<b>Antihistamin</b> har inte indikation vid anafylaxi, men är effektivt vid överkänslighetsreaktioner (klåda, Quinckeödem, urticaria), vilka kan uppträda efter akut anafylaxi eller som enda symtom.			
Tabl Caredin, munsönderfallande	5 mg	>12 år	2 tabletter
alternativt Kestine, frystorkad tablett	10 mg		2 tabletter

**Vid lindrig - måttlig överkänslighetsreaktion:** börja med kortison och antihistamin.