Akut omhändertagande vid överdos av opiater vid Mottagningen för särskild vård

Syfte och omfattning

Gäller för Mottagningen för Särskild Vård inklusive Sprututbytesmottagningen. Att säkerställa det akuta omhändertagandet av patient med överdos av opiater eller Bensodiazepiner.

Beskrivning

Vid misstanke om överdos av Opiater:

Symtom

Vid överdos av Opiater:

- Små pupiller.
- Medvetandesänkt.
- Andningsdepression.

Antidot

Naloxon är antidot mot opiater såsom heroin, metadon, opiatanalgetika. Fungerar i högre doser även mot buprenorfin (Subutex, Temgesic, Norspan).

Naloxon kan ges intravenöst (i.v), intramuskulärt (i.m), subcutant (s.c.) Nasalt, (som nässpray).

Behandling

1. Ring 588 88. Säg akutlarm vuxen, Ange plats: Kulvert ingång 78/79.
2. Ge injektion Naloxon 0,4 mg i.m. eller s.c. eller nasalt (nässpray Nyxoid 1,8 mg).
3. Sätt nål.
4. HLR vid behov.

5. Dosen kan behöva upprepas beroende på intagen substans.
6. Ge syrgas på mask.
7. Vid andningsdepression ge 0,4 mg i.m/s.c + 0,4 mg i.v.

Dokumenthistorik

Överdos vid bensodiazepiner borttagna 2024

Layout 2022.

Författare

Inger Lindgren

Datum

2016-09-28.

2024-11-13 Anna Grundström sett över layout

Referenser

Sprututbytesmottagningen i Stockholm.

Externa styrande dokument

FASS.